


ALGORITMO COVID A SEGUIR EN CENTROS EDUCATIVOS

-OPCIÓN A: El niño presenta **síntomas** en el centro educativo

SÍNTOMAS: fiebre, tos o sensación de falta de aire.
 Otros como dolor de garganta, falta de gusto, falta de olfato, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o de cabeza pueden ser considerados.



*IMPORTANTE: Hasta no tener el resultado positivo no se indicará nada a los contactos. Actividad docente normal. Tan sólo se tienen que aislar los hermanos del niño con síntomas hasta saber el resultado.

-OPCIÓN B: El niño presenta síntomas en su domicilio

SÍNTOMAS: fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros como dolor de garganta, falta de gusto, falta de olfato, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o de cabeza pueden ser considerados.

Pide cita telefónica con su médico

Si su médico pide PCR

Si su médico NO pide PCR

Aislamiento del caso sospechoso y de hermanos hasta resultados*

Tras 24h sin síntomas ni fiebre puede volver al centro educ

Si es positivo

Si es negativo, se cierra el estudio. Finaliza aislamiento.
Tras 24h sin síntomas ni fiebre puede volver al centro educativo

La familia se pone en contacto con el director o con el referente Covid del Centro educativo (**Rayuela**).

El niño permanecerá **aislado** un mínimo de 10 días y además ➡ Si síntomas de gravedad: llamar al 112 debe llevar 3 días sin síntomas.

El referente-docente Covid rellena **Anexo 3** lo más completo posible el cual envía a Dirección de salud (DS):
dsalpub.merida@salud-juntaex.es y a gestioneducovid@juntaex.es y al interlocutor de At. primaria del centro de salud (CS)

El director de DS rellenará el Anexo 1 con cuarentena de aulas o no que enviará a Educación (*Unidad para la Gestión de Casos COVID-19 en centros educativos*).
Los sanitarios rastreadores del área educativa de la DS iniciarán el estudio de contactos estrechos y piden PCR.

***IMPORTANTE:** Hasta no tener el resultado positivo no se indicará nada a los contactos. Actividad docente normal. Tan sólo se tienen que aislar los hermanos del niño con síntomas hasta saber el resultado.

-OPCIÓN C: El niño es un contacto estrecho de un positivo y está asintomático

Desde Dirección de Salud (DS) se le solicitará una prueba PCR de Coronavirus

Aislamiento por **cuarentena** del contacto entre 10-14 días
(los contactos del contacto* no se aíslan, pueden hacer vida de confinamiento con salidas sólo para lo imprescindible: trabajo, colegio, compras...)

SÍNTOMAS: fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros como dolor de garganta, falta de gusto, falta de olfato, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o de cabeza pueden ser considerados.

Si PCR positiva

Si PCR negativa la cuarentena sigue**

Si inicia **síntomas**
Pedirá cita telef. CS

La familia se pone en contacto con el director o con el referente Covid del Centro educativo (**Rayuela**)
El niño permanecerá aislado un mínimo de 10 días y además debe llevar 3 días sin síntomas.

2 opciones:- Finaliza el aislamiento si se realiza PCR a los 10 días del último contacto (la solicita DS) y es negativa.
- Finaliza el aislamiento a los 14 días del último contacto (sin PCR de control)

**En el caso del docente (personal esencial) con primera PCR negativa se puede valorar la vuelta al trabajo docente si se asegura que se cumplieron bien las medidas preventivas.

La familia se pone en contacto con el director o con el referente Covid del Centro educativo (**Rayuela**)

El referente-docente Covid rellena **Anexo 3** lo más completo posible el cual envía a Dirección de salud (DS):
dsalpub.merida@salud-juntaex.es y a **gestioneducovid@juntaex.es**
y al interlocutor de At. primaria del centro de salud (CS)

El director de DS rellenará el Anexo 1 con cuarentena de aulas o no que enviará a Educación
(Unidad para la Gestión de Casos COVID-19 en centros educativos)
Los sanitarios rastreadores del área educativa de la DS iniciarán el estudio de contactos estrechos y piden PCR

***IMPORTANTE:** Hasta no tener el resultado positivo no se indicará nada a los contactos. Actividad docente normal. Tan sólo se tienen que aislar los hermanos del contacto si tienen síntomas hasta saber el resultado.

(Elaborado por Dra. Concepción Surribas. Pediatra. DS Área Mérida)